

Esofagoscopia



UHN

(Esophagoscopy – Portuguese)

Informações para Pacientes da Unidade Cirúrgica/Médica Ambulatorial ou para Pacientes da Suite de Endoscopia

A esofagoscopia (com ou sem dilatação) é um procedimento simples.

- Ser-lhe-á dado um anestésico para a garganta.
- Ser-lhe-á feita uma aplicação intravenosa (IV) no seu braço.
- Medicamentos serão administrados pela via intravenosa para fazê-lo dormir.
- Durante o procedimento, seu médico examinará seu esófago, estômago e a parte superior do seu intestino. Para fazer isso, seu médico usará um instrumento especial chamado de endoscópio.
- O médico inserirá o endoscópio na sua garganta.
- O médico poderá colectar amostras de tecido para serem examinadas em um microscópio para detectar se há presença de doença. Estas amostras são chamadas de biópsias.
- Se o médico ver que há um estreitamento do seu esófago, pode ser necessário “alargar” esta área específica. A isso se chama de dilatação.
- Há várias maneiras de fazer uma dilatação. Seu médico explicará este procedimento antes de realizá-lo.
- O teste demora de 15 a 60 minutos.

A presente informação tem por único objectivo esclarecer e não substitui os conselhos, diagnóstico ou cuidados médicos. Queira consultar o seu profissional de saúde sobre um problema de saúde em particular. É permitida a reimpressão de uma cópia única do folheto para uso pessoal, à exclusão de qualquer fim comercial.

© 2008 University Health Network. Todos os direitos reservados.

Authors: Susan Walker RN, MN-ACNP and Gina Bryden RN, BA; MAEd

Created: 10/2004

Form: D-5029B (11/2008)



Antes do procedimento

- Não coma depois da meia-noite da noite anterior ao procedimento.
- É permitido tomar líquidos transparentes até cinco horas antes do procedimento. Estes são exemplos de líquidos transparentes: suco de maçã, água, ginger ale, chá (sem leite nem açúcar). O leite não é um líquido transparente. Caso tenha dúvidas a respeito de líquidos transparentes, telefone para o consultório de seu cirurgião.
- Caso tome algum medicamento, pergunte ao seu cirurgião se deve tomá-lo antes do procedimento.
- Se for fumante, é extremamente aconselhável que pare de fumar antes do procedimento. Até mesmo três ou quatro dias sem fumar ajudará seus pulmões a funcionarem melhor depois do procedimento.

Depois do procedimento

- Quando despertar depois do procedimento, você será transferido em uma maca até uma sala de recuperação ou a Unidade de Cuidados Pós-anestésicos (Post Anaesthetic Care Unit - PACU),
- O enfermeiro verificará seu batimento cardíaco, temperatura, pressão arterial e taxa de respiração. Essa rotina é feita várias vezes enquanto permanecer na sala de recuperação ou na PACU.
- Sua permanência na sala de recuperação ou na PACU será de aproximadamente 30 minutos. Quando estiver pronto para sair da PACU, você será levado em uma maca para a Unidade Cirúrgica/Médica Ambulatorial, onde permanecerá até estar pronto para ir para casa.
- Caso sua recuperação tenha sido na Suite de Endoscopia, você sairá de para lá para casa.
- Caso tenha passado pelo procedimento de dilatação, será feito um raio X de seu tórax antes de ir para casa.
- Assim que estiver totalmente desperto, a equipa lhe dará pequenas quantidades de líquido para tomar.

Ao chegar em casa depois do procedimento

- É possível que sua garganta fique bastante dolorida. Isso é normal e passará em alguns dias. Pastilhas para a garganta, bebidas geladas e alimentos macios podem ajudar a aliviar a dor.
- É possível que tussa ou cuspa uma quantidade pequena de sangue não coagulado. Isso deve parar depois de dois dias.

No dia seguinte ao procedimento, telefone para marcar uma consulta de acompanhamento com o cirurgião. Se biópsias forem feitas, os resultados demoram de três a cinco dias para ficarem prontos. Marque a sua consulta para quando os resultados estiverem disponíveis.

- **Não fume** por 24 horas antes e depois do procedimento.
- **Não tome bebidas alcoólicas** por 24 a 48 horas antes e depois do procedimento.
- **Não dirija nem opere** máquinas ou ferramentas eléctricas por 24 a 48 horas depois do procedimento.
- **Não tome sedativos** por 24 a 48 horas antes e depois do procedimento (a não ser que receitados pelo cirurgião).

Telefone para o cirurgião caso:

- Passe a ter febre ou calafrios dentro de cinco dias depois do procedimento.
- Tussa ou cuspa sangue depois de mais de dois dias após o procedimento.
- Comece a sentir dor nas costas, o que não acontecia antes do procedimento.
- Comece a sentir dor na região do estômago que não sentia antes do procedimento.

Localização da Unidade Cirúrgica/Médica Ambulatorial:

Segundo andar, Edifício Norte
Telefone: (416) 340 – 3851

Suite de Endoscopia

Segundo andar, Edifício Norte
Telefone: (416) 340 – 3902

Cirurgiões da Equipa de Cirurgia Torácica:

Dr. G. Darling (416) 340 - 3121
Dr. S. Keshavjee (416) 340 - 4010
Dr. A. Pierre (416) 340 - 5354
Dr. T. Waddell (416) 340 - 3432
Dr. M. DePerrot (416) 340 - 5549
Dr. K. Yasufuku 416 - 340 - 4290

Enfermeira-chefe da Unidade Cirúrgica/Médica Ambulatorial e da Suite de Endoscopia:
Deborah Hurn

Enfermeira de Prática Avançada

Susan Walker
(416) 340 - 4038