


# Catéter de Foley (permanente)

Un catéter de Foley (permanente) es una tubuladura delgada que se inserta en la vejiga y permanece en ella hasta 4 semanas por vez para drenar la orina. Los catéteres Foley son usados por cortos períodos de tiempo. Cuando otra opción no funciona, pueden ser la forma principal de vaciar la vejiga.

Los catéteres de Foley pueden relacionarse con más problemas de salud que otras opciones. [Spinal Cord Essentials](#) tiene manuales acerca de otras opciones de drenaje de vejiga. Consulte los manuales de [Catéter externo](#) (para hombres solamente) y [Cateterismo intermitente para hombres](#) o [mujeres](#).



## ¿Cuándo se usa un catéter de Foley?

La mayoría de los médicos recomiendan usar catéteres de Foley sólo por cortos períodos de tiempo. Pueden ser usados inmediatamente después de la lesión o después de la cirugía. En algunos casos, el catéter de Foley debe ser usado por largo tiempo. Este puede ser el caso si otras opciones no funcionan correctamente. Las personas con manos débiles y que no obtienen ayuda con los cuidados vesicales podrían necesitar uno. Los catéteres de Foley pueden prevenir pérdidas de orina y pueden ayudar a las personas a ser más independientes.

## Uso del catéter de Foley

Los catéteres de Foley deben ser colocados por un médico o enfermero. Una vez insertado, permanece en la vejiga a través del llenado de un pequeño balón con solución fisiológica (salina) y un pequeño agujero en el extremo de la tubuladura drena la orina. El catéter de Foley debe ser cambiado cada 3 o 4 semanas por un médico o enfermero.

**Contacte a su médico o enfermera para obtener más información.**

**CUIDADO PERSONAL**

Texto original de: Edivijes Pascua. ©2015 University Health Network - Toronto Rehab. Todos los derechos reservados. **Aviso legal:** Esta información se proporciona únicamente con propósitos educativos. Para cualquier duda específica o tratamiento médico, consulte a un especialista de la salud. La University Health Network se exime de toda responsabilidad frente a terceros por cualquier pérdida o daño ocasionado por la existencia de errores u omisiones en la presente publicación.

[www.SpinalCordEssentials.ca](http://www.SpinalCordEssentials.ca)


SCE2-Sa4-2015-11-27

# Catéter de Foley (permanente)

## Cuidados del catéter de Foley

Cuidar el catéter es importante para reducir el riesgo de problemas. Aquí hay algunos consejos para cuidar el catéter de Foley:

- Asegúrese de que la tubuladura sea lo suficientemente larga para no tirar de la vejiga.
- Asegúrese de que la tubuladura esté drenando correctamente. Verifique torceduras o curvaturas regularmente.
- Al conectar la bolsa urinaria, limpie los conectores con una gasa con alcohol.
- Siempre posicione la bolsa de orina por debajo del nivel de la cadera.
- No deje la bolsa de orina en el piso o donde pueda contaminarse con gérmenes.
- Al lavar los genitales, suavemente lave aproximadamente 5 cm (2") de la tubuladura también.



## Vaciado y limpieza de la bolsa de orina

Vacíe la bolsa cada 3 o 4 horas o cuando se esté llenando. Si la bolsa de orina se llena demasiado, la orina puede retroceder a través de la tubuladura. Esto puede causar que retorne a la vejiga y provocar infecciones en la vejiga y riñones.

Lave la bolsa de orina regularmente. Para obtener más información, consulte el manual sobre [Limpieza de la Bolsa Colectora](#) de Spinal Cord Essentials.

## Posibles problemas

Los catéteres de Foley pueden causar problemas médicos. Si tiene alguno de los siguientes síntomas, busque asistencia médica inmediatamente:

- Sangre en la orina
- Dolor
- Filtraciones por los costados

**Infección vesical** Uno de los riesgos de usar un catéter de Foley es contraer una infección vesical. Para obtener más información, consulte el manual sobre [Infecciones Vesicales](#) de Spinal Cord Essentials.

**Contacte a su médico o enfermera para obtener más información.**

**CUIDADO PERSONAL**

Texto original de: Edevijes Pascua. ©2015 University Health Network - Toronto Rehab. Todos los derechos reservados. **Aviso legal:** Esta información se proporciona únicamente con propósitos educativos. Para cualquier duda específica o tratamiento médico, consulte a un especialista de la salud. La University Health Network se exime de toda responsabilidad frente a terceros por cualquier pérdida o daño ocasionado por la existencia de errores u omisiones en la presente publicación.

[www.SpinalCordEssentials.ca](http://www.SpinalCordEssentials.ca)  
SCE2-Sa4-2015-11-27

# Catéter de Foley (permanente)

**Orina que no se drena:** Si la vejiga no está drenando, revise la tubuladura. No debe haber torceduras o curvaturas. A veces, ajustando la postura ayuda a que el catéter esté en el punto exacto para drenar. La formación de sedimento en la tubuladura puede también causar un drenado deficiente. Si no puede encontrar el motivo por el cual la orina no está drenando, consiga asistencia médica de inmediato.

**Escaras en genitales:** Los catéteres de Foley son usados frecuentemente por cortos períodos de tiempo porque pueden generar escaras en los genitales. En casos extremos, los hombres pueden tener daños que incluyen la división del pene. Si nota signos de escaras, hable con su médico.

**Cálculos renales y cáncer:** El uso del catéter de Foley por largo tiempo ha sido relacionado con otros problemas médicos. Puede tener un riesgo elevado de cálculos renales o vesicales. Además, cuando se usa el catéter de Foley por más de 10 años, se incrementa el riesgo de sufrir cáncer vesical. Visite a su médico regularmente para realizarse los chequeos correspondientes. Para obtener más información, consulte el manual de [Spinal Cord Essentials Mantenerse Sano](#).

**Disreflexia Autonómica (DA)** Tener la vejiga llena puede causar DA. Además, la DA también puede ser causada por un intestino lleno o por problemas de la piel. Si tiene una lesión medular completa a nivel T6 o superior, tiene riesgo de sufrir DA. La DA es una peligrosa condición que causa la elevación de la presión arterial y es una **emergencia médica**. Si la presión arterial asciende 20-40mmHg y tiene síntomas, ello significa que tiene DA y que debe hacer algo inmediatamente. Si no se la trata, puede causar un accidente cerebrovascular, una convulsión y hasta la muerte. Para obtener más información, consulte el manual sobre [Disreflexia Autonómica de Spinal Cord Essentials](#).

Si tiene síntomas de DA a causa del catéter de Foley, busque asistencia médica inmediatamente. Los síntomas pueden incluir:

- Dolor de cabeza palpitante
- Sudor o rubor facial
- Piel erizada
- Aumento de espasmos musculares
- Gusto metálico en la boca
- Sensación de ansiedad
- Congestión nasal
- Visión borrosa
- Ver manchas
- Náuseas
- Dificultad para respirar
- Pulso lento

**Contacte a su médico o enfermera para obtener más información.**

**CUIDADO PERSONAL**

Texto original de: Edivijes Pascua. ©2015 University Health Network - Toronto Rehab. Todos los derechos reservados. **Aviso legal:** Esta información se proporciona únicamente con propósitos educativos. Para cualquier duda específica o tratamiento médico, consulte a un especialista de la salud. La University Health Network se exime de toda responsabilidad frente a terceros por cualquier pérdida o daño ocasionado por la existencia de errores u omisiones en la presente publicación.

[www.SpinalCordEssentials.ca](http://www.SpinalCordEssentials.ca)

SCE2-Sa4-2015-11-27